

**Tabella 1. Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti misofonici (N = 42).**

<b>Sesso (%) (N)</b>	<b>Uomini 52,4 (22)</b>	
Età di esordio (età media)	13 (2-38)	
Età della diagnosi(età media)	37 (19-62)	NOTE
Suoni scatenanti (N-(%))		
Suoni dell'alimentazione <sup>1</sup>	34 (81)	1. Schiocco (di labbra), deglutizione, masticazione di patatine/frutta
Suoni della respirazione <sup>2</sup>	27 (64,3)	2. Rumori di respirazione, dalle narici, di tosse e starnuti
Suoni delle dita/mani <sup>3</sup>	25 (59,5)	3. Digitazione, schiocco di penne a scatto, unghie tagliate
Suoni dei piedi <sup>4</sup>	7 (16,7)	4. Rumore di passi, di talloni dei piedi sul pavimento
Movimenti ripetitivi visivi <sup>5</sup>	5 (11,9)	5. Ripetitiva oscillazione delle gambe
Reazione aggressiva (N-(%))		6. Distordine depressivo (ricorrente), distordine distimico
Nessuna aggressione	17 (40,5)	7. Disturbo da Deficit di Attenzione
Aggressione verbale	12 (28,6)	8. Disturbo Ossessivo Compulsivo
Orientato verso gli oggetti	7 (16,7)	9. Disturbo Ossessivo Compulsivo della Personalità
Aggressione fisica in passato	5 (11,9)	10. Tricotillomania
Aggressione fisica occasionale	1 (2,4)	a. Nessun altro distordine della personalità è stato diagnosticato nel campione.
Comorbidity psichiatrica (N-(%))		doi: 10.1371/journal.pone.0054706.t001
Disordine dell'umore <sup>6</sup>	3 (7,1)	
Panico	1 (2,4)	
ADHD <sup>7</sup>	2 (4,8)	
Sindrome di Tourette	2 (4,8)	
Ipocondria	1 (2,4)	
OCD <sup>8</sup>	1 (2,4)	
OCPD <sup>9 a</sup>	22 (52,4)	
TTM <sup>10</sup>	2 (4,8)	
Dermatillomania	1 (2,4%)	

Schröder A, Vulink N, Denys D (2013) Misophonia: Diagnostic Criteria for a New Psychiatric Disorder. PLoS ONE 8(1): e54706.

doi:10.1371/journal.pone.0054706

<http://127.0.0.1:8081/plosone/article?id=info:doi/10.1371/journal.pone.0054706>



MISOFONIA.com